

โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การเบิกจ่ายวัคซีนพื้นฐานตามโปรแกรม EPI		
รหัสเอกสาร : P - PTC - ๐๐๑	เริ่มใช้ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	แก้ไขครั้งที่ : ๔	จำนวนเนื้อหา : ๒ หน้า

วิธีปฏิบัติ เรื่อง การเบิกจ่ายวัคซีนพื้นฐานตามโปรแกรม EPI

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		
ทบทวนโดย	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)		
อนุมัติโดย	ดร.ภญ.ศรีสุตา ศิลาโชติ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ ควบคุม ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพนัง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : การเบิกจ่ายวัคซีนพื้นฐานตามโปรแกรม EPI		ปรับปรุงครั้งที่ ๔	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	

๑.วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานบริการมีวัคซีนพื้นฐานตามโปรแกรมEPI ที่เพียงพอ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคด้วยวัคซีนพื้นฐาน

๒.เป้าหมาย

สถานบริการมีวัคซีนพื้นฐานตาม โปรแกรมEPI ที่เพียงพอ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มารับ บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคด้วยวัคซีนพื้นฐาน

๓.คำจำกัดความ

วัคซีนพื้นฐาน คือวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

๑. นายชัชวาล ศิริทองมาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. โรงพยาบาลตำบลศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย/งานอนามัยแม่และเด็ก ส่งใบขอเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (แบบ ว.๓/๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๒) ที่ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากพนัง ภายในวันที่ ๒๐ ของ เดือน โดยอาจจะส่งเป็นกระดาษ หรือ electronic file ถึง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ที่รับผิดชอบงานคลัง/หัวหน้า ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
๒. เภสัชกร รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบขอเบิกวัคซีน โดย
 - ๒.๑ เด็กแรกเกิด ปริมาณการใช้ BCG กับ HB ควรเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน โดย
 - ถ้า HB มากกว่า BCG เล็กน้อย อาจเกิดจากมีลูกที่คลอดจากแม่ที่เป็น HB carrierจึงต้องให้ HB ครั้งที่ ๒ ตอนเด็กอายุ ๑ เดือน
 - ถ้า HB มากกว่า BCG ๑-๒ เท่าตัวขึ้นไป แสดงว่ายังมีการใช้วัคซีน HB ในเด็กอายุ ๒ และ ๖ เดือน แบบแยกเข็มอยู่ แต่ต้องดู DTP ประกอบด้วย หรือรวบรวม BCG มาไม่ครบ
 - โรงพยาบาลตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย ไม่มีการทำคลอด ต้องไม่เบิกวัคซีน BCG
 - ถ้า HB น้อยกว่า BCG อาจเกิดจากการรวบรวมข้อมูลมาไม่ครบ

โรงพยาบาลปากพ่อง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๒	ฉบับที่
เรื่อง : การเบิกจ่ายวัคซีนพื้นฐานตามโปรแกรม EPI		ปรับปรุงครั้งที่ ๔	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	

๒.๒ ปริมาณการใช้ DTP-HB รวมกับ DTP ต้องเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ OPV โดย

- ถ้าไม่เท่ากัน แสดงว่ารวบรวมข้อมูลมาไม่ถูกต้อง
- ถ้าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน แต่สัดส่วนระหว่าง DTP สูงกว่า DTP-HB มาก ๆ แสดงว่า มีการใช้ วัคซีน HB และ DTP แบบแยกเข็ม

๒.๓ ปริมาณการใช้ JE ต้องเป็น ๓ เท่าของปริมาณการใช้ M vaccine

- ถ้าปริมาณการใช้ IE ไม่เป็น ๓ เท่าหรือไม่ใกล้เคียงกับ ๓ เท่า แสดงว่ารวบรวมข้อมูลมาไม่ถูกต้อง

๓. เภสัชกร บันทึกค่าคงคลังของ EPI-Routine ผ่านระบบ VMI-EPI-Routine (key on hand)

ตัวชี้วัด

มีอัตราความคลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายวัคซีน $\leq 5\%$